

SAATEN-UNION.
TÖBB TERMÉS.
NAGYOBB BIZTONSÁG.

NAPRAFORGÓ
KUKORICA
SZOJA
TAVASZI ZAB
TAKARMANYBORSÓ

Tavaszi fajtakínálat 2026
www.saaten-union.hu

TISZTELT PARTNERÜNK!

Az időjárás idén sem kedvezett a növénytermesztésnek: júniusban már a rekordmelegek miatt szenvedtek a tavaszi vetésű kultúrák. És a szomorú rekordok tovább sorolhatók: januártól szeptemberig a csapadék mennyisége 120 mm-rel maradt el a szokásostól, ezen belül pedig 2025 júniusa volt a valaha regisztrált legszárazabb, az átlagos csapadéknak csak 17%-a hullott (12,2 mm). Nem csoda, hogy a kukorica termésátlaga csupán 5 tonna lett, napraforgóból 2,4 tonna, szójából pedig 2,1 tonna termett hektáronként.

Kisebb lenne a baj, ha az alacsony termésátlagot kompenzálná az ár, azonban a gazdálkodók minden évben ki vannak téve a terménypiacok változásainak. Mivel lehet ezeket a folyamatokat ellensúlyozni?

A szántóföldi növénytermesztésben a változatos vetésforgók kialakítása, illetve a fajtaválasztás a hosszú távú siker meghatározó elemei. A **SAATEN-UNION** a legújabb nemesítési és technológiai fejlesztéseket alkalmazva 2026 tavaszára is nagy teljesítményű, a tápanyagot hatékonyan felhasználó, egészséges hibrideket és fajtákat kínál. Ez az alapja a fogyasztók biztonságos ellátásának és a költséghatékony termelésnek is.

Kukoricáink egyesítik magukban a kiemelkedő termésmennyiséget, a dinamikus vízleadást és a rendkívüli termésbiztonságot. Figyelmébe ajánljuk legújabb hibridünket, a **FOXTRAIL**-t (FAO 360); valamint az **INDEM1012**-t (FAO 410), amely idén látványos eredményekkel bizonyított még a hosszabb tenyészidejű hibridekkel szemben is. Szemes hasznosításra az előbbieket mellett a korai **KABANERO** (FAO 340) és **BARINGTON** (FAO 350), a közép-korai **SU RAPIROL** (FAO 360), **BADIANE** (FAO 360), **REPLIK** (FAO 380), **SYNOPSIS** (FAO 390) és **DUELING** (FAO 390), valamint a középérésű **KABARETTO** (FAO 430) hibrideket ajánljuk. A portfóliónkat bővíti a **FILIGRAN** (FAO 450), amelyet elsősorban szilázshasznosításra ajánlunk, de szemesként is megállja a helyét.

Az alacsonyabb költségfordítási trend kedvezményezettje a napraforgó, amelyből a piaci elvárásokhoz és gyomirtási technológiákhoz igazodik a kínálatunk. A magas olajsavas (HO) napraforgó termesztéséhez az új **CELESTIS CLP** (HO) és a **SOPHIA CL** (HO) nagy teljesítményű

és könnyen kezelhető hibrideket javasoljuk. Cégünk szulfonil-urea-rezisztens napraforgóinak új generációja a **STELANTIS SU**, amely a **STINGER SU** és **ALEXA SU** hibriddel együtt tökéletes alternatívát kínál az acattal és szulákkal fertőzött területeken. A linolsavas, imazamox-ellenálló szegmens tagja a **VALPARAISO CLP**, mely a **PRETORIA CLP**, **PARAISO 102 CL** és **DRIVER CL** hibridekkel együtt biztosítja az eredményes napraforgó-termesztés biológiai alapjait.

A szója-vetésterületen széles érésidőt felölelő, kiemelkedő beltartalmi és agronómiai tulajdonságokkal rendelkező fajtáink kínálnak perspektívákat. Figyelmébe ajánljuk az új **ALLIDEA** mellett a hazánkban már bizonyító **ACARDIA**, **PAULA**, **SANLUCA** és **SURAJA** fajtáinkat. Meggyőződésünk, hogy a tavaszizab- (**PERUN**) és takarmányborsó-fajtáink (**ORCHESTRA**) is hozzájárulnak a változatos és egészséges növénytermesztés kialakításához.

A sokszínű vetésforgó nem öncélú, hiszen számos növényegészségügyi előnye van, és egyet jelent a nagyobb termésbiztonsággal. Keresse nagy szakmai tapasztalattal rendelkező területi képviselőinket, akik megosztják Önnel legújabb eredményeinket, a legfrissebb üzemi tapasztalatokat és technológiai javaslatokat. A **SAATEN-UNION**-nál biztosan megtalálja azokat a fajtákat és hibrideket, amelyek az Ön termőhelyén és technológiájához igazodva nagy terméssel és kisebb termelési kockázattal biztosítják az eredményes gazdálkodást.



[Signature]

Blum Zoltán
ügyvezető



[Signature]

Varga Gábor
termékfejlesztő



[Signature]

Lovász Ágota
termékfejlesztő

Tartalom	oldal
Kukorica	3
Napraforgó	13
Szója	21
Tavaszi zab	27
Takarmányborsó	27

KUKORICA

HIBRID	Hasznosítás	Érésidő	FAO	Termő-képesség	Aszálytűrő képesség	Korai fejlődési erély	Vízleadás	Termőhely-stabilitás	Tőszám-javaslat (ezer tő/ha)
KABANERO	szemes	korai	340	nagyon jó	nagyon jó	kirobbanó	gyors	kiemelkedő	70-72
BARINGTON	szemes	korai	350	jó	jó	jó	átlagos	nagyon jó	72-75
FOXTRAIL 	szemes	középkorai	360	kimagasló	kiváló	kirobbanó	gyors	kiemelkedő	70-75
BADIANE	szemes	középkorai	360	jó	kiváló	jó	gyors	kiemelkedő	65-70
SU RAPIROL	szemes	középkorai	360	jó	jó	erőtéljes	átlagos	nagyon jó	65-70
REPLIK	szemes	középkorai	380	kimagasló	kiváló	jó	gyors	kiemelkedő	72-75
DUELING	szemes	középkorai	390	nagyon jó	kiváló	kirobbanó	gyors	nagyon jó	70-72
SYNOPSIS	szemes	középkorai	390	nagyon jó	nagyon jó	jó	gyors	jó	72-75
INDEM1012	szemes	közép	410	kimagasló	kiváló	erőtéljes	gyors	kiemelkedő	65-75
KABARETTO	szemes	közép	430	kimagasló	nagyon jó	erőtéljes	gyors	nagyon jó	70-75
FILIGRAN	siló	közép	450	jó	nagyon jó	jó	átlagos	nagyon jó	80-85



A KUKORICATERMESZTÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

A SAATEN-UNION VÁLASZA A KIHÍVÁSOKRA

A kukorica jövőbeli helyzetének alakulását Magyarországon egyre inkább az éghajlati tényezők és a piaci viszonyok együttes hatása határozza meg. Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a legfrissebb prognózisok alapján jól látható, hogy a vetésterület folyamatosan csökken, miközben a terméskilátások is mérséklődnek, elsősorban a gyakran előforduló, hosszan tartó aszályos periódusok következtében. Ez a tendencia a vetésszerkezet átalakulását vetíti előre, amelyben az őszi vetésű kultúrák iránti igény erősödik, mivel ezek a növények jobban képesek kihasználni a téli csapadékkészleteket, és kisebb mértékben vannak kitéve a nyári hő- és vízstressznek.

Ugyanakkor a kukorica terméskilátásai regionális szinten jelentős különbségeket mutatnak. A Dél-Alföldön a gazdálkodók évről évre súlyos aszálykárokat tapasztalnak, számos helyen a növényállomány olyan mértékben károsodott, hogy a kukoricatermesztés gazdaságossága is megkérdőjeleződött. Ezzel szemben a kedvezőbb csapadékelátottságú térségekben, illetve az öntözött területeken a kukorica állományai jó állapotban vannak, ami rámutat a termőhelyi adottságok és a vízgazdálkodási megoldások döntő jelentőségére. Az aszályos időszakok további kockázatot hordoznak a mikotoxinok fokozott megjelenése miatt is, ami nemcsak a termés mennyiségi, hanem minőségi értékét is rontja, különösen a takarmány- és élelmiszeripari felhasználás szempontjából.

Ezek a folyamatok egyértelművé teszik, hogy a csökkenő méretű kukoricatermő területeken a jövőben a termesztéstechnológiai megoldások és a nemesítési eredmények összehangolt alkalmazása meghatározó lesz. A magyarországi, egyre szélsőségebb agroklímában a hibridválasztás jelentősége fokozatosan nő, hiszen a versenyképesség megőrzése és a gazdálkodás jövedelmezősége mindinkább attól függ, hogy a termesztett fajták képesek-e stabilan teljesíteni a változó környezeti feltételek között. Ennek érdekében a szelekció során a stressztűrő képesség, a termőhelyi adaptáció és az évjárat-

stabilitás kerül előtérbe, ezek azonban csak akkor biztosíthatják a termés kiesés minimalizálását, ha szoros összhangban érvényesülnek a korszerű agronómiai beavatkozásokkal, mint például a víz- és talajvédelem, a vetéssűrűség és -időztetés optimalizálása, valamint a mikotoxinok elleni védekezés.

A SAATEN-UNION portfóliójában idén is olyan kukoricahibrideket találhatnak partnereink, amelyek a szélsőséges időjárási viszonyok között is megbízhatóan teljesítenek. Kiemelt célunk, hogy minden gazdálkodó megtalálja a termőhelyi adottságaihoz és termesztési intenzitásához legjobban illeszkedő fajtát, legyen szó aszály sújtotta régióról vagy magas terméspotenciálú, intenzív körülményekről.



A **FOXTRAIL** (FAO 360) újdonságként érkezik a középkorai érésű szegmensbe. Kiemelkedő korai fejlődési erélyével és erőteljes kezdeti növekedésével gyorsan záródó, egészséges állományt képez, amely jól tűri a stresszes körülményeket. Megbízható termőképessége mellett dinamikus vízleadásával segíti a költséghatékony betakarítást.

Az **INDEM1012** (FAO 410) a középérésű hibridek között vált rövid idő alatt az egyik legbiztonságosabb választássá. Nagy hozamokra képes mind kedvező, mind gyengébb adottságú területeken. Erőteljes vitalitása és gyors vízleadása mellett a kísérleti eredmények igazolják: ez a

hibrid stabil teljesítményt nyújt eltérő termesztési körülmények között is.



A korai szegmens meghatározó tagja a **KABANERO** (FAO 340), amely kiegyensúlyozott terméshozamával és megbízható teljesítményével biztos pont a szárazabb régiókban is. Mellette a **BARINGTON** (FAO 350) zöld száron érő típusként bizonyítja sokoldalúságát, erős szárával és kiváló alkalmazkodóképességével. A **BADIANE** (FAO 360) kiváló vízleadásával és stabil termőképességével különösen alkalmas intenzív termesztési körülmények közé. Jó alkalmazkodóképessége és alacsony szemnedvessége miatt a gazdaságos, biztonságos betakarítás egyik alternatívája.

Az **SU RAPIROL** (FAO 360) különösen a virágzáskori aszályban mutatja meg erejét: jól termékenyül, erős szárat nevel, és stabil hozamot biztosít az ország egész területén. A **REPLIK** (FAO 380) évek óta a termelők egyik kedvenc

hibridje, amely kimagasló termésstabilitásával és alacsony betakarításkori szemnedvességével minden évjáratban megbízható választás.

A **DUELING** (FAO 390) alacsony növény-magasságával és kiváló állóképességével könnyen kezelhető állományt ad, ami gyors vízleadása révén a betakarításkor is előnyt jelent. Szintén ebben az éréscsoportban található a **SYNOPSIS** (FAO 390), amely országos kísérletekben is bizonyította, hogy stabilan teljesít különböző termőhelyeken, miközben kompakt állományt és dinamikus vízleadást biztosít.

A középérésű hibridek közül a **KABARETTO** (FAO 430) a dinamikus kezdeti fejlődési erélyével és megbízható termőképességével tűnik ki. Stabil teljesítményt ad szárazabb körülmények között is, miközben a csövek teljes hosszban, kiegyenlítően termékenyülnek. A **FILIGRAN** (FAO 450) magas növényeivel és nagy zöldtömegével elsősorban silóhibridként került előtérbe, de kedvező szemkihozatalának köszönhetően szemeshasznosításra is alkalmas.

E sokszínű portfólió révén a SAATEN-UNION minden gazdálkodónak kínál megoldást: a korai érésű, gyors vízleadású hibridektől a nagy terméspotenciálú középérésűekig. Célunk, hogy partnereink a változó klíma és a piaci kihívások ellenére is olyan genetikai alapokra építhessék termesztésüket, amelyek stabil hozamot és hosszú távú biztonságot nyújtanak.

Lovász Ágota termékfejlesztő



KÖZÉPKORAI ÉRÉSŰ

ÚJ

FOXTRAIL FAO 360




ELŐNYÖK

- Magas és kiegyensúlyozott terméspotenciál változatos termőhelyeken
- Megbízható teljesítmény aszályos és stresszes körülmények között is
- Kirobbanó korai fejlődési erély, erőteljes induló növekedés
- Gyors, egyenletes vízleadás a betakarítást megelőzően


JELLEMZŐK

- Kifejezetten szemeshasznosításra alkalmas
- Magas, egészséges növényállomány erektív levélállással
- Közepesen magas csőeredés, kiegyenlített csőképződés
- Kiváló zöld száron érés, ami biztosítja a tartós asszimilációt és a szemek jobb kitelítődését

A FOXTRAIL teljesítménye változó tőszám (55, 65, 75, 85 000 tő/ha) mellett
(SAATEN-UNION, AgResearch Kft., Bóly, 2025)



A FOXTRAIL teljesítménye a magasabb FAO-számú hibridek mellett
(SAATEN-UNION-demókéísérlet, Nagyhalász, 2025)



*14%-os szemnedvességre korrigálva

ELŐNYÖK

- Nagy hozam alacsonyabb és magas terméspotenciálú területeken is
- Erőteljes kezdeti fejlődés és magas fokú vitalitás
- Megbízható teljesítmény száraz és stresszes körülmények között
- Gyors és dinamikus vízleadás a költséghatékony betakarításhoz

JELLEMZŐK

- Kifejezetten szemeskukorica-termesztésre ajánlott
- Kompakt növényhabitus, alacsony csőeredés jellemzi
- Hosszan termékenyült, szépen kitelt csövek
- Jól ellenáll a golyvának és a fuzáriumnak
- Stabil teljesítmény még gyengébb talajokon is

KÖZÉPÉRÉSŰ

INDEM1012 FAO 410




KIEMELT AJÁNLAT

Az Indem1012 a Debreceni Egyetem potenciálkísérletében 2024-ben 18,18 t/ha termést ért el, az IKR Agrár nyolc helyszínes átlagában 9 t/ha fölötti hozammal az első helyen végzett, a Kukorica Klub Top 20 fajtásorában pedig 12,72 t/ha-ral a középérésű hibridek között második lett. Nagyhalászon 2024-ben 15,89 t/ha, 2025-ben pedig 18,06 t/ha termést adott. Jól reagál a mérsékelt és az intenzívebb termesztési feltételekre is. Saját tapasztalataim szerint az Indem1012-ben nincs kockázat – biztonságot és nyereséget jelent a termelőknek.


Lovász Ágota kukorica-termékfejlesztő

A top 20 kukorica hibrid termés szerinti rangsora és szemnedvessége (IKR Agrár-kísérletek, 2024, n=8)



Az INDEM1012 teljesítménye hivatalos kísérletekben

(Magyar Kukorica Klub Top 20, középérésű csoport, 2024, n=16)



KORAI ÉRÉSŰ

KABANERO FAO 340



ELŐNYÖK


- Biztos hozam még szárazabb termőhelyi viszonyok között is
- Kompakt felépítésű, jól záródó állomány
- Gyors és kiegyensúlyozott vízleadás, ami elősegíti a biztonságos betakarítást
- Cső- és szárfuzáriummal szemben kevésbé érzékeny

JELLEMZŐK

- Portfóliónk legrövidebb tenészsídejű hibridje
- Eltérő környezeti feltételek között is kiegyensúlyozott termőképesség
- Alacsonyan képződő cső, kedvező növénystruktúra
- Rugalmas betakaríthatóság, a termesztési programba könnyen beilleszthető

A KABANERO teljesítménye változó termőhelyi adottságok mellett

(SAATEN-UNION-demókísérletek, 2024, n=9)



KORAI ÉRÉSŰ

BARINGTON FAO 350



ELŐNYÖK

- Megbízható hozam szárazabb termőhelyeken is
- Átlagon felüli alkalmazkodóképesség változatos körülmények között
- Gyors kezdeti fejlődés, dinamikus kelés
- Zöld száron érő típus, kiegyensúlyozott vízleadással
- Erős szár, stabil állomány

JELLEMZŐK

- Kompakt növényfelépítés, kedvező csőeredés
- Jó állóképesség, cső- és szárfuzáriummal szemben kevésbé érzékeny
- Stabil termőképesség különböző termesztési intenzitások esetén

ELŐNYÖK

- Virágzáskor fellépő aszályos időszakban is kimagasló termékenyülés
- Az egész országban biztonsággal termeszthető
- Középmagas növények, erős szár, nem hajlamos törésre vagy dőlésre
- Gyors vízleadásra képes, alacsonyabb szemnedvességgel aratható

JELLEMZŐK

- Maradékaltalanul termékenyülő csövek, stabil asszimilációs képességgel
- Jó alkalmazkodóképesség gyengébb és intenzívebb körülmények között egyaránt
- Javasolt tőszám kedvező feltételek mellett 65-70 000 növény/ha; aszályos vagy gyenge termőhelyeken alacsonyabb vetéssűrűséggel is eredményes lehet

ELŐNYÖK

- Rendkívül jó vízleadási dinamika
- A hivatalos kísérletekben az egyik legalacsonyabb szemnedvességgel betakarított hibrid
- A szélsőséges tavaszi időjárási körülményeket jól átvészeli, sűrített vetésre is kiválóan reagál
- Csőfuzáriummal szemben kiemelkedően ellenálló

JELLEMZŐK

- Magas terméspotenciállal rendelkező, intenzív termesztésre ajánlott hibrid
- Dinamikus korai fejlődési erély jellemzi
- A növények egészségesek, betegségekre nem fogékonyak
- Stabil termőképesség, erős szár és kiváló állóképesség

KÖZÉPKORAI

SU RAPIROL FAO 360



KÖZÉPKORAI

BADIANE FAO 360



KÖZÉPKORAI

REPLIK FAO 380



ELŐNYÖK

- Az ország bármely régiójában nagy hozamokra képes
- Gyors és hatékony vízleadás, alacsony betakarításkori szemnedvesség
- Kiemelkedő teljesítmény aszályos és kedvezőtlenebb körülmények között is
- A SAATEN-UNION legnagyobb területen termesztett hibridje, a hazai hivatalos kísérletekben több éven át stabilan bizonyított

JELLEMZŐK

- Kiemelkedő termőhelyi stabilitás, megbízható minden évjáratban
- Remekül alkalmazkodik a különböző termesztési intenzitásokhoz
- Erős szár, egészséges, zölden maradó állomány
- Nagy termésbiztonság, rendkívül magas terméspotenciál

KÖZÉPKORAI

DUELING FAO 390



ELŐNYÖK


- Alacsony növénymagasság, kiváló állóképesség
- Erős, stabil szár, dőlésre és megdőlésre kevésbé érzékeny
- Gyors, dinamikus vízleadás, ami elősegíti a biztonságos, költséghatékony betakarítást
- Kiemelkedő termőhelyi és évjárat-stabilitás

JELLEMZŐK

- Kedvező szármaradvány-mennyiség, könnyebb tarlókezelés
- Kifejezetten alacsony típus, amely jól beilleszthető a vetésforgóba
- Magas terméspotenciál, amelyet több év és különböző körülmények is igazoltak

A DUELING teljesítménye és állóképessége

(GOSZ-VSZT-NAK kukorica posztregisztrációs kísérletek, korai éréscsoport, 2023–2024)



ELŐNYÖK

- Gyors és dinamikus vízleadás, alacsony betakarításkori szemnedvesség
- Stabil hozam különböző évjáratokban és termőhelyeken is
- Erős szár, törésre és megdőlésre nem hajlamos
- Biztonsággal termeszthető az ország egész területén

JELLEMZŐK


- Kiváló adaptációs képesség és kiemelkedő terméspotenciál
- Alacsonyabb habitusú, kompakt, jól záródó állomány
- Tipikus szemestípus, szépen termékenyülő csővéggel
- Erős gyökérzet és szár, megbízható állóképesség
- Üzemi és posztregisztrációs kísérletekben rendre átlag feletti eredményt ért el több hazai helyszínen is

KÖZÉPKORAI

SYNOPSIS FAO 390



A SYNOPSIS teljesítménye változó tőszám (55, 65, 75, 85 000 tő/ha) és nitrogénmennyiség (60, 120, 180 kg/ha) kijuttatása mellett (SAATEN-UNION, AgResearch Kft., Bóly, 2024)




ELŐNYÖK

- Megbízható teljesítmény szárazabb körülmények között is
- Gyors vízleadás, biztonságos betakarítás
- Dinamikus kezdeti fejlődési erély
- Nem hajlamos cső- és szárfuzárium kialakulására

JELLEMZŐK

- Középérésű hibrid, amely széles körben biztonsággal termeszthető
- Kiemelkedő termőhelyi stabilitás és nagy termésbiztonság
- Teljes hosszban termékenyült, kiegyenlített csőfelépítés
- Egészséges, erős állomány, amely a posztregisztrációs kísérletekben több helyszínen is rendre átlag feletti eredményt adott

A KABARETTO teljesítménye potenciálkísérletekben (Debreceni Egyetem, Debrecen-Látókép, 2020–2024)



KÖZÉPÉRÉSŰ

KABARETTO FAO 430

KIEMELT AJÁNLAT

SILÓ/SZEMES

KÖZÉPÉRÉSŰ

FILIGRAN FAO 450



ELŐNYÖK

- Nagy zöldtömeg, kiemelkedő silótermőképesség
- Az ország egész területén biztonsággal termesztendő, szélsőséges időjárási viszonyok között is
- Hiánytalan csőtermékenyülés, megbízható beltartalmi értékek
- Szemesként is betakarítható, ha szükséges

JELLEMZŐK

- Kifejezetten magas habitusú állomány, nagy levéltömeggel
- Átlagos vízleadású csövek, amelyek jól termékenyülnek
- Jó alkalmazkodóképesség különböző környezeti és termesztési feltételek mellett
- Magasabb javasolt tőszám kedvező termőhelyeken, gyengébb adottságok mellett alacsonyabb állomány-sűrűséggel is eredményesen termesztendő

A Filigran silókukorica beltartalmi vizsgálatának eredményei
(Agrocentina Kft., Tiszanána, vizsgálatot végezte: Agrofeed Kft. laboratóriuma)

PARAMÉTER	MÉRT ÉRTÉK	ÉRTÉKELÉS
Nedvességtartalom	69,27%	✓ optimális
Száranyag-tartalom	30,73%	✓ jó fermentációhoz
Keményítő	25,34–27,6%	✓ megfelelő energiatartalom
Nyersfehérje	8,19%	✓ átlag feletti
ADF/NDF	28,46%/46,14%	✓ kedvező rostarány
Lignin	2,99%	✓ jó emészthetőség
pH	3,81	✓ jól beérett siló
TDN (összes emészthető tápanyag)	67,9–73,1%	✓ az optimális tartományban
Tejhozam-potenciál	1530 kg/tonna	✓ erős teljesítmény

A minta kiemelkedő minőségű silókukoricát képvisel, amely a keményítő-, fehérje- és rosttartalom tekintetében is az ideális tartományban van. A TDN és tejhozam-pontenciál értékek a felső harmadban helyezkednek el, ami magas energiaszintet és kiváló tejtermelési értéket jelez.

NAPRAFORGÓ-PORTFÓLIÓNK

NAPRAFORGÓ

SU-hibridek	ALEXA SU			STINGER SU			STELANTIS SU		
Alapinformációk									
Gyomirtási technológia	tribenuron-metil-toleráns			tribenuron-metil-toleráns			tribenuron-metil-toleráns		
Olajprofil	linolsavas (LO)			linolsavas (LO)			linolsavas (LO)		
Érés csoport	középkorai			középkorai			középkorai		
Tányérállás (kitelődés idején)	bókoló			bókoló			félíg bókoló		
Fejledési típus	univerzális			generatív			generatív		
Jellemző/fajtajelleg	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas
Termőképesség	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Termésstabilitás	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●
Állóképesség	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	● ●
Növénymagasság	● ●	●		● ●	● ●		● ●	● ●	
*Betegség-ellenállóság	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ●	● ●	●
Szklerotinia (fehérpenész)	● ●	● ●	●	● ●	● ●		● ●	● ●	●
Botritisz (szürkepenész)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Peronoszpóra	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●
Szádorrezisztencia	A–E rasszig			A–G rasszig			A–G rasszig		
Vetési paraméterek									
Ajánlott termőtőszám (tő/ha)	55-58 000			55-58 000			58-60 000		

CLEARFIELD-hibridek	DRIVER CL			PARAISO 102 CL			PRETORIA CLP			VALPARAISO CLP			SOPHIA CL (HO)			CELESTIS CLP (HO)		
Alapinformációk																		
Gyomirtási technológia	Clearfield			Clearfield			Clearfield Plus			Clearfield Plus			Clearfield			Clearfield Plus		
Olajprofil	linolsavas (LO)			linolsavas (LO)			linolsavas (LO)			linolsavas (LO)			magas olajsavas (HO)			magas olajsavas (HO)		
Érés csoport	középkorai			középkései			közép			közép			középkorai			középkorai		
Tányérállás (kitelődés idején)	félíg bókoló			bókoló			félíg bókoló			bókoló			félíg bókoló			félíg bókoló		
Fejledési típus	univerzális			univerzális			generatív			univerzális			generatív			generatív		
Jellemző/fajtajelleg	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas
Termőképesség	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Termésstabilitás	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Állóképesség	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Növénymagasság	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
*Betegség-ellenállóság	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Szklerotinia (fehérpenész)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Botritisz (szürkepenész)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Peronoszpóra	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Szádorrezisztencia	-			-			A–E rasszig			A–F rasszig			-			A–F rasszig		
Vetési paraméterek																		
Ajánlott termőtőszám (tő/ha)	55-58 000			55-60 000			55-58 000			58-60 000			55-60 000			58-60 000		

* SAATEN-UNION Hungária Kft., megfigyelésen és tapasztalaton alapuló eredmények alternária-, Diaporthe-, makrofomina-ellenállóság tekintetében



NAPRAFORGÓ:

JÓ PIACI POZÍCIÓ ÉS KISZÁMÍTHATÓ JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Napjainkra jellemző a hozambiztonságot fenyegető időjárási szélsőségek erősödése. Ennek hatására a SAATEN-UNION kínálatában szereplő, jó termésstabilitású és jövedelmezően termeszthető tavaszi vetésű kultúrák szerepe egyre jobban felértékelődik. Klasszikusnak tekinthető gazdasági növényeink között a napraforgó mára a szántóföld egyik stabil pontjává vált.

A tapasztalatok újra és újra megerősítik: a változó termelési és piaci környezetben a napraforgó az egyik legjobban alkalmazkodó tavaszi vetésű növényünk. Bár az elmúlt tenyészidőszakban – a növekedés és a termésképzés időszakában – jelentkeztek kedvezőtlen hatások, a napraforgó továbbra is stabil helyet foglal el a vetésszerkezetben.

Hibridjeink többségének termesztését nem csak generatív jellege, tehát megfelelő körülmények között kimagasló terméspotenciálja teszi jövedelmezővé. Ezek a napraforgók univerzális adottságaik, azaz jobb alkalmazkodóképességük révén nagy termelési és gyakorlati értéket képviselnek, hiszen változatos viszonyok között is megbízhatóan tudnak teljesíteni, rugalmasabban reagálnak a negatív hatásokra.

A sikeres termesztés alapja a megfelelő hibrid és a hatékony technológia. Ahhoz, hogy a napraforgóval tartósan sikeresek legyünk, a

modern hibridek és gyomirtási technológiák közül a termesztési adottságainkhoz legjobban illeszkedő megoldásokat szükséges választanunk. A SAATEN-UNION napraforgói rugalmasságot biztosítanak a gyakorlati munkához: olajprofil tekintetében linolsavas (LO) és magas olajsavas (HO), gyomirtási technológiai alkalmasság tekintetében pedig imazamox-ellenálló és szulfonil-urea-rezisztens hibrideket egyaránt ajánlunk.

Ugyancsak a termesztés sikerességét segítik technológiai ajánlásaink: a kompenzációs képességek különbségei miatt a hibridek tőszámreakció-vizsgálatainak és az ezekből szerzett gyakorlati tapasztalatoknak a termőtőszám tervezése során a hatékonyság szempontjából kiemelkedő a szerepe. A tőszámhasználatra vonatkozó hibridspecifikus információk és azok alkalmazása további jól mozgósítható tartalékot jelent a napraforgóval elérhető hozamok érdekében.



Összefoglalva tehát a nemesítésnek köszönhetően olyan újgenerációs hibridek állnak rendelkezésre, amelyek nemcsak a termőképesség, hanem a stabilitás, betegségtolerancia és olajtartalom terén is magasabb szintet képviselnek.

Az idei év újdonsága a linolsavas szegmensben a **STELANTIS SU**, mely az ismert **ALEXA SU** és **STINGER SU** hibriddel együtt tökéletes alternatívát kínál az acattal és szulákkal fertőzött területeken gazdálkodóknak. Az új hibrid középkorai tenyészidejű, generatív fejlődési típusú. Termőképessége normál körülmények között ígéretes, intenzív technológia mellett pedig kiemelkedő. Tányérállása 45°-os, érésben enyhén bókóló, ezzel könnyű kezelhetőséget és jó betakaríthatóságot biztosít.

A magas olajsavas napraforgót termesztők számára érkezik a kiugróan nagy hozamokat biztosító, középkorai **CELESTIS CLP (HO)** hibridünk. Újdonságunk széles körű és stabil ellenállósággal rendelkezik a peronoszpórával szemben. Nagyon jó betegség-ellenállósága és termőhelyi alkalmazkodóképessége lehetővé teszi a legváltozatosabb termőhelyeken való felhasználását, a kórtani szempontból szűkebb vetésforgóban történő alkalmazását is. A hibrid jó megjelenésű, biztonsággal és egyenletesen beéri.

A **SOPHIA CL (HO)** az ország egész területén, aszályos körülmények között is termesztendő hibridünk, kiegyensúlyozottan magas olajtartalommal és termőképességgel.

A tavalyi év újdonságai közül a **VALPARAISO CLP** és a **PRETORIA CLP** jól vizsgáztak a gyakorlatban, olykor 4,0 t/ha hozamot meghaladó eredményeik és a kedvező tapasztalatok segítik további terjedésüket. A **VALPARAISO CLP** a sűrítésre kiugróan jól reagál, a megemelt tőszámot meghálálja, termesztését 58–60 ezer termőtő/ha-os állományokkal javasoljuk. A **PRETORIA CLP** termőtőszáma – az előzővel szemben – viszont bátran mérsékelhető, a hibrid kompenzációs képessége már a relatív alacsony, hektáronkénti 55 ezres növény számmal is eredményes.

Portfóliónk oszlopos tagjai, a **DRIVER CL** és a **PARAISO 102 CL** hibridek országszerte ismertek, erőteljes kezdeti fejlődésük, gyors záródásuk hatékony termeszethetőséggel és megbízható termés potenciállal párosul. A **DRIVER CL** jellemzően nagyon jó dinamikával fejlődő, kifejezetten homogén állományokat képez, és a mérsékelt sűrített, 55–58 ezres növény számú állományokban kiváló eredményeket mutat.

A SAATEN-UNION nagy hozamú, kiváló olajtartalmú napraforgóhibridjeivel elérhető a stabil hozam, a kiszámíthatóság és a profitabilitás. Napraforgót vetni még a kiszámíthatatlan, egyre aszályosabb időjárási körülmények között is jó döntés – a megfelelő hibriddel pedig kiemelkedően megtérülő befektetés.

Varga Gábor termékfejlesztő

CLHA PLUS (CLEARFIELD PLUS)

ÚJ

CELESTIS CLP (HO)



ELŐNYÖK

- Piacképes termék, olajprofilja alapján kibővíti az értékesítési lehetőségeket
- Csökkentett növényvédelmi költség, jól észszerűsíthető növényvédelmi beavatkozások, kisebb termesztési kockázat
- Biztonságosan termeszthető akár szűk vetésforgóban, illetve olyan területeken is, ahol a fertőzési nyomás várhatóan magas
- Egyenletesen érő, jó megjelenésű állomány

JELLEMZŐK

- Nagy termőképességű, középkorai tenyészidejű, magas olajsavas (HO) hibrid
- Stabil a betegség-ellenállósága, különösen a hamuszürke és a fehérpenészes szárkorhadással és a peronoszpórával szemben
- Kiemelkedő ellenálló képességet mutat a leggyakoribb kórokozókval szemben (nagyon jó kórtani rezisztenciális profil)
- Kedvező, 45°-os tányérállású növényfelépítés jellemzi

MAGAS OLJASAVAS NAPRAFORGÓ
– IMISUN

SOPHIA CL (HO)




ELŐNYÖK

- Megkésett vetésre alkalmas
- Fő- és másodvetésre is javasolt
- Az ország egész területén biztonsággal termeszthető
- Kedvező agronómiai tulajdonságok

JELLEMZŐK

- Középérésű magas olajsavas (HO) hibrid
- Aszályos körülmények között is megbízhatóan teljesít
- Közepes növénymagasság
- Jó szárstabilitás

A CELESTIS CLP (HO) és a SOPHIA CL (HO) teljesítménye termékfejlesztési kísérletekben
(SAATEN-UNION, 2025, n=3)




ELŐNYÖK

- Kiemelkedően jó, ígéretes termésre, nagy hozamra képes
- Széles a termőhelyi alkalmazkodóképessége, egyenletesen érlik, kiváló a termésstabilitása
- Változatos adottságú területeken is versenyképesen termeszthető
- Könnyen és hatékonyan kezelhető állomány

JELLEMZŐK

- Újgenerációs, tribenuron-metil (SU) toleráns napraforgóhibrid
- Középkorai tenyészidejű, generatív fejlődés jellemzi
- Magas a terméspotenciálja normál és intenzív technológiában is
- Félig bókoló tányérállású, stabil szárú, jó állóképességű és kiugróan egészséges

A STELANTIS SU teljesítménye termékfejlesztési kísérletekben
(SAATEN-UNION, 2025, n=3)



ÚJ

TRIBENURON-METIL-
REZISZTENS

STELANTIS SU

LINOLSAVAS NAPRAFORGÓ
– TRIBENURON-METIL-TOLERÁNS

ALEXA SU




ELŐNYÖK

- Szulfonil-urea-rezisztens
- Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhetően jól kezelhető
- Állományszárítás nélkül termesztethető
- Fóma- és szklerotínia-ellenállósággal rendelkezik, szádorrezisztencia A–E rasszokra

JELLEMZŐK

- Linolsavas (LO) napraforgóhibrid
- Alacsony, bókoló típus, kompakt habitussal
- Középkorai érésű
- A napraforgó jellegzetes betegségeivel szemben ellenáll

Az ALEXA SU teljesítménye üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2023–2024)



LINOLSAVAS NAPRAFORGÓ
– TRIBENURON-METIL-TOLERÁNS

STINGER SU




ELŐNYÖK

- Állományszárítást nem igényel, állományaiban fellépő évelő gyomkonkurencia hatékonyan kezelhető
- Intenzitáshatékony, nagy termés és átlagot jelentősen meghaladó olajtartalom
- A szár- és levélbetegségekkel, valamint a szádorral (A–G rasszig) szemben ellenálló

JELLEMZŐK

- Középkorai érésidő, középmagas és bókoló megjelenésű, tribenuron-metil-rezisztens
- Linolsavas olajprofil, generatív fejlődési típus, ígéretes hozam
- Jó betegségekkel szembeni ellenállóság, stabil növényegészség

A STINGER SU teljesítménye nemzetközi fejlesztési kísérletekben (SAATEN-UNION, 2024)



ELŐNYÖK

- Kifejezetten magas olajtartalom
- Az ország egész területén biztonsággal termeszthető
- Kedvező agronómiai tulajdonságok jellemzik
- Betegségekkel szemben ellenálló

JELLEMZŐK


- Középkorai érésű linolsavas (LO) hibrid
- Aszályos körülmények között is megbízhatóan teljesít
- Jó szárszilárdság, dőlésre nem hajlamos
- Szádorrezisztens (A–E)
- Tányér- és szárszklerotínia-ellenállósága jó

LINOLSAVAS NAPRAFORGÓ – CLHA PLUS

PRETORIA CL PLUS



A PRETORIA CLP teljesítménye üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2024–2025)



ELŐNYÖK

- Kifejezetten jól kezelhető, egyenletes állomány
- Hektolitersúlya jóval átlag feletti, olajtartalma pozitív minőségi bonifikációt jelenthet
- Korszerű, növénykórtani szempontból megbízható teljesítmény
- Meggyőző termőhelyi és évjárat stabilitás

JELLEMZŐK


- Középérésű, középkorai virágzás, kedvező növényfelépítés
- Ezerkaszattömege magas, kaszatok héj-bél aránya kiváló, olajtartalma magas
- Levél- és szárbetegségekkel szemben kiváló, tányérbetegségekkel szemben átlagos ellenállóság
- Univerzális hibrid, kiemelkedő produktivitás

LINOLSAVAS NAPRAFORGÓ – CLHA PLUS

VALPARAISO CL PLUS



A VALPARAISO CLP teljesítménye üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2024–2025)



DRIVER CL



KIEMELT AJÁNLAT


ELŐNYÖK

- Stabílan magas és megbízható termés-potenciál, kimagasló olajtartalommal
- Bátran vethető a gyengébb adottságú területeken is
- Állománykezelése és betakaríthatósága a kisebb gazdaságoknak sem jelent gondot

JELLEMZŐK

- Középkorai érésű linolsavas (LO) hibrid
- Letisztult habitus, közepesen magas növények, gyengén bókoló jellegű tányérállás
- Betegségeknek ellenálló, egészséges növényállomány

A DRIVER CL teljesítménye üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2023–2024)



PARAISO 102 CL



ELŐNYÖK

- Dőlésre nem hajlamos
- Extenzív körülmények között is gazdaságosan termeszthető
- Rezisztens a hazai peronoszpórarásszokra és jól ellenáll a szklerotíniának
- Termesztése valamennyi termőhelyen javasolt

JELLEMZŐK

- Középérésű linolsavas (LO) hibrid
- Robusztus növény szerkezet, kiváló szárszilárdság
- Erőteljes kezdeti fejlődési erély
- Kiváló tolerancia a gombabetegségekkel szemben

SZÓJA

SZÓJAPORTFÓLIÓNK

FAJTÁK	ACARDIA			PAULA			ALLIDEA ÚJ			SURAJA			SANLUCA		
Alapinformációk															
Éréscsoport	igen korai-korai			korai			korai			korai			középkorai		
Éréscsoport-jelölés	000/00			00/0			00/0			0			0/1		
Tenyészdő (nap)	110-115			120-125			120-125			125-130			135-140		
Növekedési típus	determinált			determinált			féldeterminált			féldeterminált			féldeterminált		
Jellemző/fajtajelleg	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas	alacsony	közepes	magas
Termőképesség	● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Pro-Fat	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	
Állóképesség	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Kompenzációs képesség	● ●	● ●		● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
*Betegség-ellenállóság	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Vetési paraméterek															
Ajánlott társzám (csíra/ha)	600–650 000			550–600 000			550–600 000			550–600 000			450–500 000		
Sortáv (cm)	12,5–25,0 (45,0)			12,5–25,0 (45,0)			12,5–25,0 (45,0)			12,5–25,0 (45,0)			25,0–45,0 (75,0)		
Vetésidő (felhasználás)	IV. 15. – V. 10. (fővetés)			IV. 15. – V. 10. (fővetés)			IV. 15. – V. 10. (fővetés)			IV. 15. – V. 10. (fővetés)			IV. 15. – V. 10. (fővetés)		

* SAATEN-UNION Hungária Kft., megfigyelésen és tapasztalaton alapuló eredmények szklerotínia-, Diaporthe-, peronoszpóra-, makrofomina-ellenállóság tekintetében





KORSZERŰ SZÓJAFAJTÁK, MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEK

A hazai termelők zöme rendelkezik olyan adottságú földterülettel, ahol a szója megfelelően fejlődik. Az elmúlt években ezt országszerte jól jelzi a vetésterület bővülése, a termelési kedv stabilizálódása.

Ha felkészülünk rá, a szója takarékos technológiával és jövedelmezően termeszthető. A vetésforgóba jól beilleszthető, a relatív alacsonynak mondható termésszintek is már könnyedén fedezik a ráfordításokat. A szója kismértékű termésingadozás mellett megbízhatóan terem. Kiváló megtérülés jellemzi, hiszen könnyen és jó áron értékesíthető, rövid ideig köti le a termőföldet, így a ráfordítások gyorsan kifizetődnek. Mindezek ismeretében hazai viszonylatban tovább szükséges dolgozni azon, hogy a gazdálkodók bátrabban nyúljanak a szójához és egyéb pillangós fehérjenövényekhez. Ebben a munkában kiemelt a szerepe a szakmailag megalapozott, a termelési régió sajátosságaihoz illeszkedő fajtahasználatnak, ami már félsikert jelent.

A SAATEN-UNION a hazai viszonyokra, a helyben megfogalmazódó termelési szempontokat figyelembe véve állítja össze szójaajánlatát. Ennek érdekében a termőképesség megcélzását alapvetőnek tekintjük. Ugyanakkor cégünk a nemesítés és a hazai körülményekhez illeszthető fajták kiválasztása során kiemelt figyelemmel tekint az alkalmazkodóképességre, termésszabilyra, kedvező érési és beltartalmi tulajdonságokra és a veszteségektől mentes betakaríthatóságra is. Ezek az agronómiai


szempontból meghatározó tulajdonságok hozzájárulnak napjaink korszerű, fenntartható és sikeres szójatermesztéséhez. Az elvárt siker érdekében – a szója esetében fokozott elővigyázatossággal, a tapasztalatokra alapotlan – szükséges a gazdálkodóknak a saját adottságaikhoz megtalálni a megfelelőt. A portfóliónkban szereplő fajták széles tenyésztési intervallumot ölelnek fel, aminek köszönhetően a termőhely fekvésének megfelelően választható ki az, amelyik biztonságosan beéri. Valamennyi portfóliótag korszerű, modern fajta, kifejezetten stabil hozammal.

Az **ACARDIA** szójaportfóliónk tavaly bevezetett tagja, amely kiemelkedő alkalmazkodóképességének köszönhetően univerzális fajta. Minden régióban, minden időjárási körülmény között kiváló technológiai stabilitással és nagy hozamokkal jellemezhető. Tenésztideje 110-115 nap, ami lehetővé teszi a biztonságos termesztést és a stabil beérést az őszi kampánymunkák előtt, még Észak-Magyarországon is. Figyelemre méltó a fajta szárszilárdsága és kiemelkedő szklerotínia-ellenállósága.

A kompakt felépítésű **PAULA** egyedülálló tulajdonsága, hogy kiemelkedően jól kompenzálja a szélsőséges termőhelyi adottságokat és a

Szójafajták eredményei tőszámreakció-kísérletekben

(SAATEN-UNION, termékfejlesztési kísérletek, Bóly, 2025)



szójatáblákon olykor ebből eredő tőszámhiányos állapotot is. Ezt az igazán korszerű fajtát nem csupán a jó termőhelyeken, hanem a legváltozatosabb termesztési körülmények között is sikerrel hasznosíthatjuk a jövedelmező szójatermesztés érdekében. Sőt, a korai érésidő első felébe tartozó PAULA-ra kiemelkedő évjárat-stabilitására alapozva az ország egész területén magabiztosan számíthatunk.

Szójaajánlatunkat töretlenül fejlesztjük, az idei évben portfóliónkat pedig a hazai gyakorlati termelést meghatározó éréscsoportban frissítjük. Ennek eredményeképpen a korai éréscsoport első felébe tartozó **ALLIDEA** ígéretes új fajtára hívjuk fel a figyelmet. Az ALLIDEA kiváló választás mind normál, mind intenzív termesztési körülmények között. Nagy terméspotenciálja és stabil teljesítménye révén a termőhelyen realizálható hozamszint jelentősen növelhető.

A fajta gyors kezdeti fejlődése és kompakt, gazdagon elágazó, féldeterminált habitusa előnyt jelent a dinamikus záródó állomány szempontjából, míg a hozampotenciál szempontjából meghatározó generatív jellege ragyogó termékenyülési adottságokkal párosul. Nagyon jó állóképessége, gyors sorzáródása és jól kezelhető méretű állománya egyszerűsíti a termesztéstechnológiát. Az ALLIDEA a 120-125 napos tenyészidőnek köszönhetően rendkívül rugalmasan kezelhető, hiszen minden termesztési régióban jól teljesít, és biztonsággal beérik. Legyen szó bármelyik technológiai szintről, ez a fajta hatékony és eredményes megoldást kínál a szójatermesztők számára.

SURAJA fajtánk hozamcsúcsok és hozambiztonság szempontjából egyaránt az eddigiekénél is magasabbra emeli a lécet. Agronómiai adottságai kedvezőek, jól kezelhető, egészséges és kiváló állóképességű növényállományt fejleszt. Stabílan magas termőképessége kiemelkedő terméseredmények elérését biztosítja. Figyelemre méltó, hogy hosszán jelentkező szárazságban, aszályos évjáratban az üzemi termesztés és a tesztek során is évjárat csúchozamokat mutat. A SURAJA a korai érésidő második felébe tartozik, ezzel ugyancsak kiemelkedő jövedelmezőséget biztosít az ország valamennyi termelési régiójában.

Nagy termőképességű, középkorai tenyészidejű fajtánk a **SANLUCA**. Kiemelkedő produktivitás mellett jó minőséget is ad: magtermés, olajtermés és fehérjetermés tekintetében egyaránt megbízható fajta. Tenyészideje 135-140 nap, aminek köszönhetően jellemzően a korai éréscsoport végén, a középérés elején válik betakaríthatóvá – gyakorlati szempontból középkorai –, ennek megfelelően felhasználását elsősorban hazánk déli és középső régióiban javasoljuk.

A körülményekhez illeszkedő fajta választása meghatározó jelentőségű a termelés szempontjából, és minden esetben bizalmi kérdés. Hogy valóban megérje szóját vetni, a sikeres munkához válasszon fajtát a SAATEN-UNION Hungária Kft. stabil és megbízható hozammal, kiforrott agronómiai adottságokkal rendelkező, modern szójaportfóliójából!

Varga Gábor termékfejlesztő

KORAI (00/0)

ÚJ

ALLIDEA




ELŐNYÖK

- Mind normál, mind intenzív termesztés esetén nagy hozamok elérésére alkalmas
- Megdőlésre nem hajlamos, a sorok gyorsan záródnak, jól kezelhető állományt képez
- Univerzális, minden régióban jól teljesítő fajta, amely biztonsággal beérik

JELLEMZŐK

- Gyors kezdeti fejlődésű, nagy termőképességű, generatív jellegű fajta
- Féldeterminált növekedés, kompakt, gazdagon elágazó növényfelépítés jellemzi
- Korán, 120-125 napos tenyészidővel érlik

Az ALLIDEA teljesítménye a nagyüzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2024–2025)



ELŐNYÖK

- Tenyészideje 110-115 nap, ami lehetővé teszi a biztonságos termesztést és a stabil beérést az őszi munkálatok előtt még Észak-Magyarországon is
- Magas üzemi hozamszintek (3,5-4,0 t/ha), nagy termésstabilitás mellett
- A fokozott és nagyon stabil szklerotíniatoleranciája miatt az intenzív (akár szója után szója vagy a szűk vetésforgójú) területek fajtája

JELLEMZŐK

- Igen korai-korai, 000/00-s éréscsoport
- Univerzális fajta: minden régióban, minden időjárási körülmények között kiváló technológiai stabilitás jellemzi
- Kiemelkedő ellenálló képesség szklerotíniával és egyéb betegségekkel szemben

IGEN KORAI-KORAI (000/00)

ACARDIA



ELŐNYÖK

- Jövedelmező termeszthetőség és könnyen kezelhető állomány, változatos termesztési körülmények között, az ország egész területén alapozhatunk rá
- Kiemelkedően jól kompenzálja a tőszámhiányt, a szárazság és aszály hatásait
- Meghökkenően nagy egyedi produkció, kiváló termőképesség

JELLEMZŐK

- Kompakt felépítés, stabil és kiemelkedő hozam
- Korai tenyészidő első felébe tartozik (120-125 nap)
- Kiválóan alkalmazkodik a termőhelyhez, strapabíró fajta
- Determinált, de jól elágazó növényfelépítés, kiváló termékenyülési viszonyok, nagy hüvelyszám, a hüvelyek emeletenként csokros elrendeződésben fejlődnek


KORAI (00/0)

PAULA



KIEMELT AJÁNLAT

A PAULA teljesítménye a nagyüzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2021–2025)



KORAI (0)

SURAJA

KIEMELT AJÁNLAT


ELŐNYÖK

- Biztonságos termeszthetőség, kimagasló, 4,5-5,0 t/ha közötti, stabil hozam, magas ProFat-értékkel
- Széleskörűen alkalmazkodik: elsősorban az ország középső és déli termőközrteiben kiváló eredményre képes, kedvező agronómiai adottságokkal
- Hazai előállítású, magas minőségű vetőmag

JELLEMZŐK

- Hazai fajtaregisztáció, éréscsoportjának legnagyobb termőképességű és nagyon jó minőséget adó fajtája
- A tenyészidő hossza kedvező, jól illeszkedik a klímánkhoz (125-130 nap)
- Betegség-ellenálló képessége kiváló, a gyomirtó szerekkel szemben toleráns

A SURAJA teljesítménye nagyüzemi kísérletekben (SAATEN-UNION, 2022–2024 [kivonat])



KÖZÉPKORAI (0/I)

SANLUCA

ELŐNYÖK

- Kiemelkedő hozamszint, jó minőség: magtermés, olajtermés és fehérjetermés tekintetében egyaránt megbízható fajta
- Kompenzációs képessége jó, állománya jól szellőzik, stabil állóképességű, a tenyészidő és a betakarítás során egyaránt jól kezelhető: kedvező termesztési feltételeket biztosít
- Különböző talajadottságok és termesztési körülmények között is megállja a helyét: jó hozamstabilitás, alkalmazkodóképessége átlagon felüli

JELLEMZŐK

- Két éréscsoport határán helyezkedik el: tenyészideje 135-140 nap, aminek köszönhetően a korai éréscsoport végén válik betakaríthatóvá
- Agronómiai szempontból kedvező növényfelépítés és jó helyen fejlődő alsó hüvelyemelet, közepes (85-90 cm) magasság, erős és jól elágazó szár, féldeterminált növekedés
- Intenzív kezdeti fejlődés, az egészséges lombozat és a hosszú virágzási időtartam nagy termés-potenciált biztosít

TAVASZI ZAB

ELŐNYÖK

- Megdőlésre nem hajlamos állomány, könnyű betakaríthatóság
- Humán élelmezési célra is alkalmas, jól értékesíthető árumag
- Agronómiai és technológiai rugalmasság: gyökeresen eltérő környezeti körülmények, extenzív viszonyok között is sikeres
- Korszerű fajtajelleg, nagy termőképesség

JELLEMZŐK

- Robusztus és strapabíró növényfelépítés
- Szemtermése magas HL-súlyú, kiváló fehérjetartalmú, nagyon jó hántolási tulajdonságokkal, magas béta-glükán-tartalommal
- Kontinentális típus: termőhelyi alkalmazkodóképessége és vetésidő-toleranciája nagyon jó-kiváló
- A tavaszizab-nemesítés ékköve (NÉBIH 3 vizsgálati év átlaga = 6,0 t/ha-t meghaladó termésszint)

TAVASZI ZAB

PERUN



TAKARMÁNYBORSÓ

ELŐNYÖK

- Jól illeszkedik a vetésforgóba (az őszi árpákkal egy időben betakarítható) és kiemelkedően gazdaságosan termeszthető
- Kórtani szempontból megbízható: hagyományos, ökológiai és biotermesztésre is alkalmas, kimagasló termőképesség

JELLEMZŐK

- Középkorai érésidő, fuzáriumos tőelhalással szemben rezisztens
- Dinamikus, homogén virágzás ésérés, nagyon jó állóképesség
- Termése nagyméretű, átlagon felüli ezerszemtömegű, sárga magbelső és világos maghéj jellemzi, amely fehérjében gazdag, egészséges, kiváló takarmány-alapanyag

KÖZÉPKORAI

ORCHESTRA



TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK



I. régió:

Virág Attila régióvezető

Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu



7. területi képviselő:

Szajbert Zoltán

Fejér és Komárom-Esztergom
vármegye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu



12. területi képviselő:

Arany Ferenc

Csongrád-Csanád vármegye
Mobil: +36-30-742-8421
arany.ferenc@saaten-union.hu



1. területi képviselő:

Markovics Fanni

Győr-Moson-Sopron vármegye
Mobil: +36-30-430-0029
markovics.fanni@saaten-union.hu



8. területi képviselő:

Pataki István

Pest vármegye
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu



13. területi képviselő:

Gellén András

Békés vármegye
Mobil: +36-30-127-1661
gellen.andras@saaten-union.hu



2. területi képviselő:

Kónya Zsolt

Vas és Veszprém vármegye
Mobil: +36-20-569-0540
konya.zsolt@saaten-union.hu



9. területi képviselő:

Molnár Krisztián

Bács-Kiskun vármegye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu



14. területi képviselő:

Dr. Dudás László

Hajdú-Bihar vármegye
Mobil: +36-30-335-4655
dudas.laszlo@saaten-union.hu



3. területi képviselő:

Horváth Tamás

Zala vármegye
Mobil: +36-30-192-3306
horvath.tamas@saaten-union.hu



II. régió:

Lovász Ágota régióvezető

Mobil: +36-20-436-0360
lovasz.agota@saaten-union.hu



15. területi képviselő:

Baleda István

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Mobil: +36-30-268-1465
baleda.istvan@saaten-union.hu



4. területi képviselő:

Fantoly Miklós

Somogy vármegye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@saaten-union.hu



10. területi képviselő:

Nagy János

Nógrád vármegye és
Heves vármegye nyugat
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu



16. területi képviselő:

Bartku Gergő

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Mobil: +36-30-567-8659
bartku.gergo@saaten-union.hu



5. területi képviselő:

Dömse Dénes

Baranya vármegye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu



11. területi képviselő:

Töltéssy Áron

Heves vármegye kelet és
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Mobil: +36-30-231-2160
toltesy.aron@saaten-union.hu



6. területi képviselő:

Szalai Szabina

Tolna vármegye
Mobil: +36-30-179-6863
szalai.szabina@saaten-union.hu

